

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしてください

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

チャック →

第3類医薬品

メコバラミン主剤
販売名：ヘルビタSプラス

⊗ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】

次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

☞ (相談すること)

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹、かゆみ 消化器：吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、胃部不快感 精神神経系：めまい
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
ショック(アナフィラキシー)：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
軟便、下痢、便秘
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 服用後、生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】3錠中

メコバラミン(活性型ビタミンB12) 1,500µg、葉酸 5mg、コハク酸 d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE) 100mg、フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体) 109.16mg[フルスルチアミンとして100mg]、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 100mg、ニコチン酸アミド 60mg、パントテン酸カルシウム 30mg、ガンマーオリザノール 10mg
添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖水和物、マクロゴール、ゼラチン、タルク、炭酸Ca、乳酸Ca水和物、ケイ酸Ca、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、アラビガム、白糖、酸化チタン、カルナウバロウ、カルメロースNa

【用法・用量】

次の1回量を食後に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1錠	1日3回
15才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

【効能・効果】

● 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6562-7411

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

⚠ 使用上の注意

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりして保管してください。(本剤は光に対して不安定です。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本剤は落下などの衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いにはご注意ください。(5) 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。(6) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。(7) 袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931